

EC FERTİLİZER
BOR (B), BAKIR (Cu-Sülfat), DEMİR (Fe-Sülfat) MANGAN (Mn-Sülfat), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞİMİ
Lexa Combi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: w/w
Suda Çözünür Bor (B)	: % 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0.5
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.09
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 7



KLOR İÇERİĞİ	0,88
---------------------	------

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün Adı	Topraktan Gr/Da	Yapraktan Gr/ 100 Lt. Su	Uygulama Zamanı
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	500-1000gr	100-250gr	Fide Dikimlerinde, Çiçeklenme Başlangıcında 1-2 Uygulama 20-25 Gün Arayla
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	500-1000gr	100-250gr	Fide Dikimlerinde, Çiçeklenme Başlangıcında 1-2 Uygulama 20-25 Gün Arayla
Meyve Ağaçları	30-150gr/Ağaç	100-250gr	Fidan Dikimlerinde, Çiçeklenme Başlangıcında 1-2 Uygulama 20-25 Gün Arayla
Bağlar	1000-2000gr/da	100-250gr	Toprak Ve Yaprak Uygulamaları Vejetatif Uyanmadan Başlayarak Hasada Kadar Tüm Yetiştirme Dönemi İçinde 4-5 Uygulama İle Tekrarlanır. Uygulamaya, Noksansız Belirtilerinin İlk Görüldüğü Anda Başlanır Ve Belirtiler Kaybolana Kadar Devam Edilir.
Zeytin	30-150gr/Ağaç	100-250gr	Hasat Sonrası, Çiçek Öncesi Ve Çiçek Sonrası
Narenciye	30-150gr/Ağaç	100-250gr	Hasat Sonrası, Çiçek Öncesi Ve Çiçek Sonrası
Fındık	100gr/Ocak	100-250gr	Çiçek Öncesi Ve Çiçek Sonrası
Çilek	500-1000gr	100-250gr	Sezon Boyunca 2-3 Uygulama
Patates, Havuç	1000-1500gr	100-250gr	Sezon Boyunca 2-4 Uygulama
Şeker Pancarı	1000-1500gr	100-250gr	Sezon Boyunca 2-4 Uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	1000-1500gr	100-250gr	Sezon Boyunca 2-3 Uygulama
Pamuk	500-1000gr	100-250gr	Sezon Boyunca 2-4 Uygulama

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

AGROMANS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR
GIDA ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK LTD. ŞTİ.
Yeşikam Mah. Kemalpaşa Cad. No: 352/8B
Tel: 0533 301 94 35 - 0533 302 94 35 Bornova-İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 008 090 2180